

Tableau 17.0a. Erreurs-types relatives (%) de la biomasse aérienne totale sur les terres forestières selon le type de forêt et la classe d'âge au Canada.

Type forestier	Âge (années)											
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	141-160	161-180	181-200	201+	Autres ¹
Mixte	4,3	4,0	2,9	2,6	2,5	4,7	7,3	10,8	22,6	46,4	25,7	0,0
Conifères	4,1	3,7	3,0	2,4	1,4	1,8	2,6	4,3	5,4	7,2	3,3	0,0
Feuillus	4,8	5,0	3,4	3,1	3,9	6,7	10,9	20,6	30,5	44,2	45,6	0,0
Non boisé	37,6	49,4	42,5	55,3	40,0	44,7	100,0	0,0	56,5	0,0	0,0	2,6

Source: Inventaire forestier national du Canada, données révisées de 2006 (Version 3, Décembre 2013) (<http://nfi.nfis.org>)

Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plaines hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha.

¹ Classe d'âge manquante ou inconnue.