

Tableau 18.0a. Erreurs-types relatives (%) de la biomasse aérienne totale sur les terres forestières selon le groupement d'essences et la classe d'âge au Canada.

Groupe d'espèces	Âge (années)											
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	141-160	161-180	181-200	201+	Autres ¹
Non classe	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
Feuillus non identifié	7,4	17,6	29,3	60,6	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres feuillus	11,3	10,2	10,4	9,5	19,7	23,7	32,7	73,2	64,9	0,0	0,0	0,0
Erable	11,2	8,2	5,1	6,1	7,1	13,9	17,4	27,9	61,0	100,0	85,1	0,0
Bouleau	12,5	7,0	4,6	4,6	5,6	10,1	18,9	66,4	56,4	90,5	100,0	0,0
Peuplier	6,8	5,3	3,8	3,0	3,8	6,6	10,6	21,1	23,8	62,9	36,9	0,0
Conifère non identifié	5,3	8,2	20,5	54,5	73,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cedre et autres conifères	39,7	14,4	12,6	9,8	12,1	13,2	25,9	25,4	32,2	34,4	8,5	0,0
Meleze	11,1	10,5	11,9	13,1	12,4	15,6	18,8	21,6	25,0	41,9	33,0	0,0
Douglas	39,7	23,1	17,6	14,6	13,0	9,9	12,8	12,2	15,3	20,7	13,2	0,0
Pruche	43,9	18,0	16,0	18,1	18,1	20,1	26,2	19,7	21,1	21,8	6,1	0,0
Sapin	11,6	5,7	4,8	6,0	5,4	7,7	10,0	10,6	10,6	12,3	5,9	0,0
Pin	7,9	6,4	5,6	4,3	4,3	5,6	6,5	8,3	11,4	15,9	12,6	0,0
Epinette	6,4	4,7	3,4	2,6	1,4	1,8	2,8	5,6	7,4	12,0	6,1	0,0

Source: Inventaire forestier national du Canada, **données révisées de 2006** (Version 3, Décembre 2013) (<http://nfi.nfis.org>)

Note: Les écozones de l'Arctique (Cordillère arctique, Haut-Arctique, Bas-Arctique), et les écozones de la Taïga des plaines et des Plaines hudsoniennes situées au Nunavut, ne sont pas répertoriées. La superficie totale s'élève à 262 189,89 mille ha.

¹ Classe d'âge manquante ou inconnue.